

Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA table 5 (Révision 2011)

Atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses

**Publié par les
médecins de la Suva**

Case postale, 6002 Lucerne
Téléphone 041 419 58 51
www.suva.ch

Référence
2870/5.f
Edition 2000

Taux d'atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses

Arthroses légères: pas d'indemnité

Endoprothèses: on applique le même taux, que la prothèse soit partielle ou totale

Si l'articulation considérée présente une **instabilité** en plus de l'**arthrose**, on retiendra le taux d'atteinte à l'intégrité le plus élevé (Exemple: pangonarthrose grave avec instabilité complexe: **30 à 40 %**). Pas de cumulation en règle générale. Conformément à l'arrêt 313/02 (arrêt du TFA du 4. 9. 2003), l'implant d'une endoprothèse s'oriente sur l'état non corrigé, c'est-à-dire sur le degré de gravité de l'arthrose avant l'implant (colonnes 2 et 3). Pour les prothèses implantées directement après l'accident (endoprothèses primaires), les colonnes 5 et 6 entrent en application. Pour les résections ou les arthrodèses, la colonne 4 demeure applicable.

	Arthrose moyenne	Arthrose grave	Résection ou arthrodèse	Endoprothèse avec résultat bon	Endoprothèse avec résultat mauvais
a. acromio-claviculaire	0 %	5-10 %	5 %	-	-
a. de l'épaule (gléno-humérale)	5-10 %	10-25 %	25 %	15-20 %	25 %
a. du coude	5-10 %	10-25 %	25 %	15-20 %	25 %
résection de la tête radiale	5 %	10 %	7,5 %	5 %	7,5 %
résection de la tête cubitale	0 %	5 %	5 %	-	-
a. radiocarpienne	5-10 %	10-25 %	15 %	10 %	15-20 %
a. intracarpienne	5-10 %	10-15 %	10 %	-	-
résection de la 1 ^{ère} rangée des os du carpe	-	-	10-15 %	-	-
rhizarthrose	5 %	5-10 %	10 %	5 %	10 %
résection du trapèze	-	-	10 %	-	-
a. des doigts	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
coxarthrose	10-30 %	30-40 %	20-40 %	20 %	40 %
			(arthrodèse 25 %)		
a. fémoro-patellaire	5-10 %	10-25 %	5-10 %	5 %	10-25 %
a. fémoro-tibiale	5-15 %	15-30 %	25 %	20 %	40 %
a. du genou (pangonarthrose)	10-30 %	30-40 %	25 %	20 %	40 %
a. tibiotarsienne	5-15 %	15-30 %	15 %	10-15 %	20-25 %
a. sous-astragaliene	5-15 %	15-30 %	15 %	-	-
a. de toute la cheville	10-30 %	30-40 %	20 %	-	-
a. de l'articulation de Chopart	5-10 %	10-20 %	15 %	-	-
a. de l'articulation de Lisfranc	5-10 %	10-20 %	15 %	-	-
hallux rigidus	0 %	5 %	5 %	0 %	5 %
a. des orteils	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %