

Integritätsentschädigung gemäss UVG Tabelle 5 (Revision 2011)

Integritätsschaden bei Arthrosen

**Herausgegeben von den
Ärzten der Suva**

Postfach 4358, 6002 Luzern
Telefon 041 419 51 11
www.suva.ch

Bestellnummer
2870/5.d
Ausgabe 2011

Integritätsschaden bei Arthrosen

Leichte Arthrosen: keine Entschädigung

Endoprothesen: Teil- oder Totalprothesen werden gleich bewertet

Wo neben der **Arthrose** noch eine **Instabilität** des betreffenden Gelenkes nachgewiesen wird, soll derjenige Zustand für die Integritätsentschädigung massgebend sein, der die höhere Schätzung aufweist (z.B. schwere Pangonarthrose bei Komplexinstabilität: 30–40 %); in der Regel keine Kumulation. Bei Endoprothesen ist gemäss U 313/02 (EVG Urteil vom 04.09.2003) auf den unkorrigierten Zustand abzustellen, d.h. auf den Schweregrad der Arthrose vor Prothesenimplantation (Spalten 2 und 3). Bei Prothesen, die direkt nach dem Unfall eingesetzt werden (primäre Endoprothese), kommen Spalten 5 und 6 zur Anwendung. Bei Gelenksresektion oder Arthrodese ist unverändert Spalte 4 anwendbar.

	Arthrose mässig	Arthrose schwer	Gelenkresektion oder Arthrodese	Endoprothesen guter Erfolg	Endoprothesen schlechter Erfolg
AC-Arthrose	0 %	5–10 %	5 %	–	–
Omarthrose (glenohumeral)	5–10 %	10–25 %	25 %	15–20 %	25 %
Ellbogen-Arthrose	5–10 %	10–25 %	25 %	15–20 %	25 %
Radiusköpfchen	5 %	10 %	7,5 %	5 %	7,5 %
Ulnaköpfchen	0 %	5 %	5 %	–	–
Handgelenk-Arthrose	5–10 %	10–25 %	15 %	10 %	15–20 %
Handwurzel-Arthrose	5–10 %	10–15 %	10 %	–	–
proximale Handwurzelresektion	–	–	10–15 %	–	–
Rhizarthrose	5 %	5–10 %	10 %	5 %	10 %
Trapezoidektomie	–	–	10 %	–	–
Fingergelenk-Arthrose	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Coxarthrose	10–30 %	30–40 %	20–40 % (Arthrodese 25 %)	20 %	40 %
Femoropatellar-Arthrose	5–10 %	10–25 %	5–10 %	5 %	10–25 %
Femorotibial-Arthrose	5–15 %	15–30 %	25 %	20 %	40 %
Pangonarthrose	10–30 %	30–40 %	25 %	20 %	40 %
OSG-Arthrose	5–15 %	15–30 %	15 %	10–15 %	20–25 %
USG-Arthrose	5–15 %	15–30 %	15 %	–	–
Panarthrose OSG/USG	10–30 %	30–40 %	20 %	–	–
Fusswurzel-Arthrose (Chopart)	5–10 %	10–20 %	15 %	–	–
Lisfranc-Arthrose	5–10 %	10–20 %	15 %	–	–
Hallux rigidus	0 %	5 %	5 %	0 %	5 %
Zehengelenk-Arthrose	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %