

Indennità per menomazione dell'integrità a norma della LAINF

Tabella 5 (revisione 2011)

Menomazione dell'integrità per artrosi

Pubblicata dai medici
dell'Istituto Nazionale Svizzero di
Assicurazione contro gli Infortuni

Suva
Casella postale 4358, 6002 Lucerna
Telefono 041 419 51 11

Menomazione dell'integrità per artrosi

Artrosi lieve: nessun risarcimento

Endoprotesi: le protesi parziali o totali vengono valutate in modo uguale

Se oltre all'**artrosi** si può dimostrare un'**instabilità** dell'articolazione colpita, si tiene conto della valutazione più elevata (per esempio una pangonartrosi con instabilità: **30–40%**); di regola non cumulabile. In conformità con la sentenza 313/02 (sentenza del TFA del 4.9.2003), nel caso d'impianto d'endoprotesi, il tasso corrisponde allo stato non corretto, rispettivamente corrisponde alla gravità dell'artrosi prima dell'intervento protesico (colonne 2 e 3). Nel caso d'impianto protesico primario (subito dopo l'infortunio), le colonne 5 e 6 sono adoperate per la definizione del tasso. In esiti d'artrodesi o di resezione, rimane valida la colonna 4.

| | Artrosi moderata | Artrosi grave | Resezione articolare o artrodesi | Endoprotesi con esito favorevole | Endoprotesi con esito non favorevole |
|---|-------------------------|----------------------|---|---|---|
| Artrosi acromio-claveare | 0% | 5–10% | 5% | – | – |
| Omartrosi (gleno-omeroale) | 5–10% | 10–25% | 25% | 15–20% | 25% |
| Artrosi del gomito | 5–10% | 10–25% | 25% | 15–20% | 25% |
| Capitello radiale | 5% | 10% | 7,5% | 5% | 7,5% |
| Testa dell'ulna | 0% | 5% | 5% | – | – |
| Artrosi del polso | 5–10% | 10–25% | 15% | 10% | 15–20% |
| Artrosi della radice della mano | 5–10% | 10–15% | 10% | – | – |
| Resezione prossimale della radice della mano | – | – | 10–15% | – | – |
| Rizartrosi | 5% | 5–10% | 10% | 5% | 10% |
| Trapezoidectomia | – | – | 10% | – | – |
| Artrosi delle articolazioni delle dita della mano | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Coxartrosi | 10–30% | 30–40% | 20–40% | 20% | 40% |
| | | | (artrodesi 25%) | | |
| Artrosi femoro-rotulea | 5–10% | 10–25% | 5–10% | 5% | 10–25% |
| Artrosi femoro-tibiale | 5–15% | 15–30% | 25% | 20% | 40% |
| Pangonartrosi | 10–30% | 30–40% | 25% | 20% | 40% |
| Artrosi dell'art. talocrurale | 5–15% | 15–30% | 15% | 10–15% | 20–25% |
| Artrosi dell'art. subtalare | 5–15% | 15–30% | 15% | – | – |
| Panartrosi delle art. talocrurale e subtalare | 10–30% | 30–40% | 20% | – | – |
| Artrosi dell'articolazione di Chopart | 5–10% | 10–20% | 15% | – | – |
| Artrosi dell'articolazione di Lisfranc | 5–10% | 10–20% | 15% | – | – |
| Alluce rigido | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% |
| Artrosi delle dita del piede | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |